



Agencija za lekove i  
medicinska sredstva Srbije



Dentokind®, tablete, 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg

DAV: belladonna (n): D6, chamomilla (n): D6, ferum phosphoricum (n): D6, hep. ac. fucus (n): D12,  
puissantia (n): D6

homeopatski lek

Pozivaju pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe ovog leka jer su važne za Vas.

Ovaj lek se može učiniti bez lječničke prekogranične potrebe, neophodno je da podljevi koristi lek Dentokind® da biste se vratili:

#### **UPUTSTVO ZA LEK**

Upotrijevavajući ovaj lek, možete biti sigurni da ćete dobiti dobrodošlu pomoć.

Ako imate dodatni pitanja, obavestite svoj lečioca.

Ukoliko se Vasi simptomi ne poprave ili ne počnu da se bolje posle nekoliko dana, morate se poraziti avdicu.

**Dentokind®, tablete, 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg**

**Pakovanje: bočica staklena, 1 x 150 tableta**

homeopatski lek

U ovom uputstvu predstavljaju:

1. Šta je lek Dentokind® i zašto ga treba uzimati?

2. Šta treba da znate pre nego što počnete sa Dentokind®?

3. Kako se uzima Dentokind®?

4. Moguće nadele i rizike uzimanja Dentokind®.

**DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH**

Proizvođač: **& CO. KG**

Adresa: **Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka**

Podnositelj zahteva: **ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)**

Adresa: **Ibarska 5, Beograd**

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind®, tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta



## 1. ŠTA JE LEK DENTOKIND I ČEMU JE NAMENJEN

- Dentokind®, tablete, 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg

INN: belladonna trit. D6, chamomilla trit. D6, ferrum phosphoricum trit. D6, hepar sulfuris trit. D12, pulsatilla trit. D6

homeopatski lek

### Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Dentokind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se обратити свом лекару.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

### U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Dentokind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dentokind
3. Kako se upotrebljava lek Dentokind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Dentokind
6. Dodatne informacije

Uvod u lek Dentokind na upoznajanje materijala vodilna i rekovana saglasnost

Nije primenljivo. Lek je namenjen deca.

Važne informacije o nekih snagečima leka Dentokind

Dentokind sadrži lekove (mladeni sitter). U slučaju neotoljanice i Vašeg dočeta na neke od sestava, obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka.

### 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Dentokind

Uvek uzimajte lek Dentokind oružje. Kada Vam je prepisao lekar ili farmaceut, uobičajena doza je:

Deca od 0 do 1 godine: Kad akutni tegoba dati po 1 tabletu na svaki sat, do najviše 6 tabletu u toku dana.  
Naknadno poboljšanja stane, dati po 1 tabletu 3 puta na dan.

Deca od 1 do 6 godina: Kad akutni tegoba dati po 2 tabletu na svaki sat, do najviše 12 tabletu u toku dana.  
Naknadno poboljšanja stane, dati po 2 tabletu 3 puta na dan.

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind®; tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta

## 1. ŠTA JE LEK DENTOKIND I ČEMU JE NAMENJEN

Dentokind je homeopatski lek namenjen olakšavanju tegoba nastalih u toku nicanja zuba kao što su iritiranost, povišena temperatura, dijareja i bol u uhu kod beba i dece.

Primena ovog leka se zasniva samo na načelima homeopatije.

## 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DENTOKIND

**Lek Dentokind ne smeti koristiti:**

Dentokind ne smeti davati Vašem detetu:

- ako znate da je alergično na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka (vidite odeljak 6. Šta sadrži lek Dentokind).

**Kada uzimate lek Dentokind, posebno vodite računa:**

Obratite se lekaru:

- Ako ne dođe do poboljšanja stanja ili ako se tegobe učestalo ponavljaju
- Ako dođe do pojave dodatnih tegoba.

**Primena drugih lekova**

Nisu primećene interakcije sa drugim lekovima.

Kažite lekaru ili farmaceutu ako Vaše dete uzima ili je do nedavno uzimalo bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

**Uzimanje leka Dentokind sa hranom ili pićima**

Ne preporučuje se uzimanje leka Dentokind istovremeno sa hranom i pićem. Lek Dentokind treba uzimati najmanje pola sata pre ili posle jela.

**Primena leka Dentokind u periodu trudnoće i dojenja**

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

**Uticaj leka Dentokind na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama**

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

**Važne informacije o nekim sastojcima leka Dentokind**

Dentokind sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije Vašeg deteta na neke od šećera, obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka.

## 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Dentokind

Uvek uzimajte lek Dentokind onako kako Vam je propisao lekar ili farmaceut. Uobičajena doza je:

**Deca od 0 do 1 godine:** Kod akutnih tegoba dati po 1 tabletu na svaki sat, do najviše 6 tableta u toku dana. Nakon poboljšanja stanja, dati po 1 tabletu 3 puta na dan.

**Deca od 1 do 6 godina:** Kod akutnih tegoba dati po 2 tablete na svaki sat, do najviše 12 tableta u toku dana. Nakon poboljšanja stanja, dati po 2 tablete 3 puta dnevno.



Preporučuje se da se tableta uzme pola sata pre ili posle jela. Pre primene potrebno je rastvoriti tabletu u malo vode.

#### Ako ste uzeli više leka Dentokind nego što je trebalo

U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

#### Ako ste zaboravili da uzmete lek Dentokind

Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadiли propuštenu.

#### Ako naglo prestanete da uzimate lek Dentokind

Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Dentokind ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

### 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Dentokind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotreboom leka Dentokind. Ukoliko posumnjate da Vaše dete ima neželjena dejstva nakon primene leka Dentokind, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Dentokind i konsultujte se sa svojim lekarom.

#### Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije  
Nacionalni centar za farmakovigilancu  
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd  
Republika Srbija  
website: [www.alims.gov.rs](http://www.alims.gov.rs)  
e-mail: [nezeljene.reakcije@alims.gov.rs](mailto:nezeljene.reakcije@alims.gov.rs)

### 5. KAKO ĆUVATI LEK DENTOKIND

#### Rok upotrebe

*Rok upotrebe pre prvog otvaranja boćice: 5 godina*

*Rok upotrebe nakon prvog otvaranja boćice: 12 meseci.*

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind®; tablet; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; boćica staklena, 1x150 tableta

## Čuvanje

*Uslovi čuvanja pre prvog otaranja boćice:* Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Čuvati van domaćaja i vidokruga dece!

*Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja boćice:* Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Šta sadrži lek Dentokind

1 tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Belladonna trit. D6	15 mg,
Chamomilla trit. D6	15 mg,
Ferrum phosphoricum trit. D6	15 mg,
Hepar sulfuris trit. D12	15 mg,
Pulsatilla trit. D6	15 mg

Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; talk; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat.

### Kako izgleda lek Dentokind i sadržaj pakovanja

Okrugle ravne tablete bele boje fasetiranih ivica.

U kutiji se nalazi boćica od tamnog stakla tipa III, sa HDPE zatvaračem na navoj bele boje, sadrži 150 tableta, i Uputstvo za lek.

### Nosilac dozvole i Proizvođač

#### Nosilac dozvole:

ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA) Ilirska 5  
Beograd

#### Proizvođač:

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG Ottostrasse 24  
76227 Karlsruhe  
Nemačka

### Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2015.

#### Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind®; tablet; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; boćica staklena, 1x150 tableta



---

**Broj i datum dozvole:**

515-01-00133-15-001 od 08.09.2015.

**PUTNI BROJ LEX**

Dentokind®; tablete; 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg + 15 mg  
Bočica staklena, lrx 150 tableta

Prerecno patente lek

Proizvod: DEUTSCHE PHARMAHOLD-UNION DENTOKIND GMBH & CO. KG  
Adresa: Orlastra 24, 76375 Lorsch, Nemačka  
Podnosič zahteva: ALENK PHARMA DOO BEograd (PALETTA)  
Adresa: Hirka 5, Beograd

---

Broj rešenja: 515-01-00133-15-001 od 08.09.2015. za lek Dentokind®; tableta; 15mg+15mg+15mg+15mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta

---