



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije



Dormikind[®], tablete, 15 mg + 20 mg + 15 mg
INN cypripedium pubescens D4, magnesium carbonicum D7A, zizium valerianicum D12
homeopatski lek

Pazljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može postaviti bez ikakvog simptoma. Medutin, neoprezno je da pažljivo koristite
lek Dormikind, da biste se njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sadržava: Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršavaju ili nastupe novi simptomi, obratite se
svom lekaru.

Ukoliko neko celokupno dejstvo postane neprijatno ili nastupe neki neželjeni dejstva koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da svom lekaru obavestite svog lekara ili farmaceutu.

U ovom uputstvu pročitate:

1. Šta je lek Dormikind
2. Za šta se koristi
3. Kako se upotrebljava
4. Mogući neželjeni dejstva
5. Kako čuvati lek Dormikind
6. Dodatne informacije

Dormikind[®], tablete, 15 mg + 20 mg + 15 mg
Pakovanje: bočica staklena, 1 x 150 tableta

Homeopatski lek

Proizvođač: **DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH
& CO. KG**

Adresa: **Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka**

Podnosilac zahteva: **ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)**

Adresa: **Ilirska 5, Beograd**



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

Dormikind[®], tablete, 15 mg + 20 mg + 15 mg
INN cypripedium pubescens D4, magnesium carbonicum D10, zincum valerianicum D12
homeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Dormikind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitćete:

1. Šta je lek Dormikind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dormikind
3. Kako se upotrebljava lek Dormikind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Dormikind
6. Dodatne informacije



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

1. ŠTA JE LEK DORMIKIND I ČEMU JE NAMENJEN

Dormikind je homeopatski lek namenjen tretmanu uznemirenosti i nesanice kod beba i dece. Primena ovog leka se zasniva samo na načelima homeopatije.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DORMIKIND

Lek Dormikind ne smete koristiti:

Dormikind ne smete davati Vašem detetu:

- Ako znate da je alergično na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka (vidite odeljak 6. Šta sadrži lek Dormikind).

Kada uzimate lek Dormikind, posebno vodite računa:

Obratite se lekaru:

- Ako ne dođe do poboljšanja stanja ili ukoliko se tegobe učestalo javljaju

- Ako dođe do pojave dodatnih tegoba.

Primena drugih lekova

Nisu primećene interakcije sa drugim lekovima. Kažite lekaru ili farmaceutu ako Vaše dete uzima ili je do nedavno uzimalo bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Dormikind sa hranom ili pićima

Ne preporučuje se uzimanje leka Dormikind istovremeno sa hranom i pićem. Lek Dormikind treba uzimati najmanje pola sata pre ili posle jela.

Primena leka Dormikind u periodu trudnoće i dojenja

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Uticaj leka Dormikind na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Dormikind

Dormikind sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DORMIKIND

Uvek uzimajte lek Dormikind onako kako Vam je propisao lekar ili farmaceut. Uobičajena doza je:

Deca od 0 do 6 godina: uzeti po 1 tabletu 4 puta na dan.

Tablete treba uzeti pola sata pre ili posle jela. Pre primene potrebno je rastvoriti tabletu u malo vode.

Ako ste uzeli više leka DORMIKIND nego što je trebalo

U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih efekata.



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

Ako ste zaboravili da uzmete lek Dormikind

Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Dormikind

Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Dormikind ne očekuje se pojava štetnih efekata.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek Dormikind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom homeopatskog leka Dormikind. Ukoliko posumnjate da Vaše dete ima neželjena dejstva nakon primene ovog leka, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Dormikind i konsultujte se sa svojim lekarom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK DORMIKIND

Rok upotrebe

Rok upotrebe pre prvog otvaranja bočice: 5 godina

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 12 meseci

Čuvanje

Uslovi čuvanja pre prvog otvaranja bočice: Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja bočice: Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Dormikind

1 tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Cypripedium pubescens D4 15 mg,

Magnesium carbonicum D10 20 mg,

Zincum valerianicum D12 15 mg.

Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Dormikind i sadržaj pakovanja

Okrugle ravne tablete bele boje fasetiranih ivica.

U kutiji se nalazi bočica od smeđeg stakla tip III sa HDPE zatvaračem bele boje koja sadrži 150 tableta i

Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)

Ilirska 5

Beograd

Proizvođač:

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG

Ottostrasse 24

76227 Karlsruhe

Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2015.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.



Agencija za lekove i
medicinska sredstva Srbije



Broj i datum dozvole:

515-01-00134-15-002 od 08.09.2015.

LEK ZA LEK

Dormikind[®], tableta, 15 mg + 20 mg + 15 mg
Pakovanje: bočica staklena, 1 x 150 tableta

Homoeopatski lek

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION[®] DRU-ARZNEIMITTEL (DMBU)
& CO. KG

Adresa: Othmarsloh 24, 76227 Klotzbach, Nemacka

Podnosilac zahteva: ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)

Adresa: Birska 5, Beograd

Broj rešenja: 515-01-00134-15-002 od 08.09.2015. za lek Dormikind[®]; tableta; 15mg+20mg+15mg; bočica staklena, 1x150 tableta